

BORMAX**10 l (13,75 kg)**

Používat pouze v případě skutečné potřeby.
Nepřekračovat doporučené dávkování.

HNOJIVO-EU

KFV 1 (C) (II) (a): Jednosložkové anorganické hnojivo se stopovými živinami

Roztokové hnojivo se stopovou živinou

11 % bór (B) 150 g/l, ve vodě rozpustný
(B) (11)

Výrobek obsahuje 4,75 % dusík (N)

Složky: Reakční produkty monoetanolamínu a kyseliny borité
(1:3)¹ (EC 701-024-0)

¹KSM 1: Látka a směs z původního materiálu

Hodnota pH: 7 - 8

Ekologické zemědělství: BORMAX splňuje požadaky nařízení
(EU) 2018/848 a je povoleno pro ekologické zemědělství.

Výrobce/Dovozce: Amalgerol CZ s.r.o.

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Tel.: +420 724 726 597 | www.amalgerol.cz

POKYNY

Bezpečnost: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Po použití důkladně umyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Po požití vypláchněte ústa a vypijte velké množství vody, nevyvolávejte zvracení. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Skladování: Skladovat v originálním balení v dobře větraných prostorách v teplotním rozmezí +5 °C až +25 °C. Chránit před mrazem, horkem a slunečním zářením. Balení vždy těsně uzavřené. Skladovat odděleně od potravin a krmiv. Uchovávat mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Likvidace: Zamezte vzniku odpadů nebo pokud je to možné, zajistěte minimalizaci odpadů. Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace. Odstranění v souladu s lokálními a národními předpisy.

BORMAX**Oblasti použití**

Používat jen při skutečné potřebě. Doporučená aplikační množství jsou průměrné hodnoty z praxe. Pro exaktní nasazení doporučujeme půdní, popř. listovou analýzu. Stanovená aplikační množství nesmí být překročena. Neaplikovat při extrémním počasí (při velkém horku nebo při nebezpečném mrazu). Aplikovat jen při neporušené voskové vrstvě listů.

Aplikační množství na hektar: Min. množství vody 300 l

Aplikace na půdu (u všech kultur): 5 l/ha před výsevem popř. výsadbou

Řepka: 3 l na počátku prodlužovacího růstu, při nedostatku aplikaci opakovat cca po 10 - 14 dnech

Cukrovka: 3 l při 6 - listovém stádiu, při nedostatku aplikaci opakovat cca po 10 - 14 dnech

Kukuřice: 3 l ve 4 - 10 listovém stádiu

Slunečnice: 2 - 3 l od 4 - 6 listového stádia

Tykev: 3 l před uzavřením řádků, množství vody 400 - 600 l

Luskoviny: 2 l v 10 - 15 cm-stádiu, při nedostatku aplikaci opakovat po cca 10 - 14 dnech

Bobuloviny: 1 l ve stádiu poupat, při nedostatku aplikaci opakovat po cca 10 - 14 dnech, množství vody 500 - 1000 l

Jádroviny a peckoviny: 1 l před květem popř. po květu, 2 l po sklizni před sežloutnutím listů, množství vody 500 - 1000 l

Brambory: 3 l od uzavření řádků při ošetření fungicidy, při nedostatku aplikaci opakovat po 10 - 14 dnech

Zelenina: na kultury se zvýšenou potřebou bóru např. karotka, zelí, rajčata: 2 - 3 aplikace se 2 l, u celeru vždy 3 l pro aplikaci, odstup mezi aplikacemi 10 - 14 dní, množství vody min. 500 l

Vino: 1 l před květem popř. po květu, množství vody 300 - 500 l

Chmel: 3 l od polovíční výšky konstrukce, množství vody 500 - 1000 l



www.amalgerol.cz

BORMAX | CZ | 140x126 mm
Label version: 07.01.2025, 14:58

AMALGEROL CZ

POSTLUJE PŮDU, ROSTLINY, ZVÍŘATA

