



EU: K FV 1(C)(I)(b)(i): Jednozložkové kapalná anorganické hnojivo s makroživinami

K (S) 25 (42) / 20,75 (16,8)

25 % oxid draselný (K_2O) (= 20,75 % K), ve vode rozpustný

42 % Trioxid sirový (SO_3) (= 16,8 % S), ve vode rozpustný

SLOŽKY

Potassium thiosulfate¹ (c. CAS 10294-66-3)

¹KSM 1: Látky a směsi z původního materiálu

Kapalina v roztoku. Nízký obsah chloridů.

Hodnota pH: 7,5 - 8,5

VÝROBCE / ZABALIL/A

Hechenbichler GmbH

Cusanusweg 7-9, A-6020 Innsbruck, Rakousko

Tel.: +43 512 29 18 10 - 0 | www.hechenbichler.com

DOVOZCE

Amalgerol CZ s.r.o.

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

Tel.: +420 724 726 597 | www.amalgerol.cz

BEZPEČNOST

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekurte. Po použití důkladně umyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazené, a pokud je lze vymout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Po požití vypláchněte ústa a vypijte velké množství vody, nevyvolávejte zvracení. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDIŠKO/lékáře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

POKYNY

Skladování: Udržovat nádrže těsně uzavřené a uchovávat na chladném, dobře větraném místě. Doporučená skladovací teplota: Hodnota +5 °C až +25 °C. Chráněte před mrazem, teplem, slunečním zářením. Uchovávat odděleně od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Odstraňování: Zamezte vzniku odpadů nebo pokud je to možné, zajištěte minimalizaci odpadů. Nesmí se

odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace. Odstranění v souladu s lokálními a národními předpisy.

OBLAST POUŽITÍ

Tekuté hnojivo pro zemědělství a zahradnictví. Používat pouze v případě skutečné potřeby. Pro exaktní dávkování doporučujeme půdnu nebo listovou analýzu. Nepřekračovat doporučené dávkování.

Před použitím KALIMAX spolu s postřikem a preparáty jiných výrobců bezpodmínečně provést test na míšitelnost a snášenlivost. Je třeba dbát návodů k použití všech účastníků míchání. Nepoužívejte v extrémních povětrnostních podmínkách (např. při silném slunečním svitu, při teplotách nad 25 °C, při nebezpečí mrazu, po deštivých obdobích).

POZOR: Nepoužívat na kultury pod sklem/folií. KALIMAX nemíchat s kyselými produkty (ne pod 6 pH v dávkovacím roztoku). Stríkat jen při neporušené voskové vrstvě.

Před použitím řádně protřepat. Před použitím řádně protřepat a promíchat. Vmíchat přes filtr do cisterny naplněné do ½ vodou, potom doplnit a stríkat. Během celé doby transportu a postřiku míchat! Zamezte vdechování mlhy/pár/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Aplikáční techniku před a po použití řádně vyčistit. Poslední použití před sklízí: nejméně 8 dní.

Brambory: 2 aplikace po 3 - 6 l/ha od počátku tvorby hlíz (cca 10 mm); v odstupu cca 14 - 21 dnů; množství vody: min. 300 l

Obiloviny: 1 - 2 aplikace po 3 - 6 l/ha od odnožování až do konce metání; množství vody: min. 300 l

Víno: 3 - 6 l/ha pro aplikaci, od 2. týdne po počátku kvetení a každých 7 - 10 dnů opakovat; množství vody: 500 l

Luskoviny: 3 - 6 l/ha počínaje od konce poupát až do počátku kvetení (max. 10 % rozkvětení); množství vody: 300 l

Jahody, borůvky: 2 - 4 l/ha, 7 - 10 dní před sklízí; množství vody: 500 - 1000 l

Jablka: 3 - 6 l/ha od 2. týdne po začátku kvetení a každých 7 - 10 dnů opakovat; množství vody: 900 - 1000 l

Peckoviny: 3 aplikace se 2 - 4 l/ha od vývoje plodu v odstupu cca 10 - 14 dnů; množství vody: 500 - 1000 l



EU: PFC 1(C)(I)(b)(i): Jednozložkové kvapalná anorganické hnojivo s obsahom makroživiny

K (S) 25 (42) / 20,75 (16,8)

25 % oxid draselný (K_2O) (= 20,75 % K), vo vode rozpustný

42 % Trioxid síry (SO_3) (= 16,8 % S), vo vode rozpustný

ZLOŽKY

Potassium thiosulfate¹ (c. CAS 10294-66-3)

¹CMC 1: Pôvodné látky a zmesi

Kvapalina v roztoku. Nízký obsah chloridov.

Hodnota pH: 7,5 - 8,5

VÝROBCA / ZABALIL

Hechenbichler GmbH

Cusanusweg 7-9, A-6020 Innsbruck, Rakousko

Tel.: +43 512 29 18 10 - 0 | www.hechenbichler.com

DOVOZCA

AMALGEROL SK s.r.o.

Fraňa Kráľa 35, 811 05 Bratislava

Tel.: +420 724 726 597 | www.amalgerol.sk

BEZPEČNOST

Zabraňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Pri používaní výrobku nejezte, nepijte ani nefajčíte. Po použití umyť ruky. Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO ZASTAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa a vypijte veľa vody. Nevyvolávajte zvracanie. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

POKYNY

Skladovanie: Udržiať obaly tesne uzavreté a uchovávať na chladnom, dobre vetranom mieste. Odporúčaná skladovacia teplota: Hodnota +5 °C až +25 °C. Chráněte před mrazem, teplem, slunečním zářením. Uchovávat odděleně od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.



Likvidácia: Zabráňte vzniku odpadov alebo pokiaľ je to možné, zaistite minimalizáciu odpadov. Nesmie sa odstraňovať spoločne s odpadmi z domácnosti. Zabráňte úniku do kanalizácie. Odstránenie v súlade s lokálnymi a národnými predpismi.

OBLASTI POUŽITIA

Tekuté hnojivo pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo. Používať iba v prípade skutočnej potreby. Na exaktné dávkovanie odporúčame pôdnu alebo listovú analýzu. Nepřekračovať odporúčané dávkovanie.

Pred použitím KALIMAX spolu s postrekom a preparátmi iných výrobcov bezpodmínečne vykonať test na miešateľnosť a znášanlivosť. Je potrebné dbať na návody na použitie všetkých zložiek miešania. Nepoužívať v extrémnych poveternostných podmienkach (napr. pri silnom slnečnom svite, pri teplotách nad 25 °C, pri nebezpečí mrazu, po daždivých obdobiach). **POZOR:** Nepoužívať na kultúry pod sklom/fóliou. KALIMAX nemiešať s kyslími produktmi (nie pod 6 pH v dávkovacom roztoku). Striekať len pri neporušenej voskovej vrstve.

Pred použitím riadne pretrepať. Miešajte kontajner! Vmiešajte filter do cisterny naplnenej do ½ vodou, potom doplniť a striekať. Počas celej doby transportu a postreku miešať! Zabráňte vdychovaniu hmly/pár/aerosolov. Používať ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné okuliare/tvárový štít. Aplikácnú techniku pred a po použití riadne vyčistiť. Posledná aplikácia pred zberom: najmenej 8 dní.

Zemiaky: 2 aplikácie v dávke 3 - 6 l/ha od štádia počiatku tvorby hlíz (cca 10 mm); v odstupu cca 14 - 21 dní; množství vody: min. 300 l

Obilniny: 1 - 2 aplikácie v dávke 3 - 6 l/ha od fázy odnožovania po objavenie sa vľajkového listu; množství vody: min. 300 l

Vínohrady: 3 - 6 l/ha pre aplikáciu, od 2. týždňa po začiatku kvitnutia a každých 10 - 14 dní opakovat; množství vody: 500 l

Strukoviny: 3 - 6 l/ha počnúc od konca pukov až do začiatku kvitnutia (max. 10% rozkvitnuté); množství vody: 300 l

Jahody, čučoriedky: 2 - 4 l/ha, 7 - 10 dní pred zberom; množství vody: 500 - 1000 l

Jablka: 3 - 6 l/ha od 2. týždňa po začiatku kvitnutia a každých 7 - 10 dní opakovat; množství vody: 900 - 1000 l

Kostkoviny: 3 aplikácie s 2 - 4 l/ha od vývoja plodu v odstupu cca 10 - 14 dní; množství vody: 500 - 1000 l

Obsah/Obahu: 10 l (14,7 kg)

www.amalgerol.cz
www.amalgerol.sk

KALIMAX | CZ | SK | 210x148 mm | Label version: 28.11.2024, 09:17



POSILUJE PŮDU, ROSTLINY, ZVÍŘATA



POSILUJE PŮDU, RASTLINY, ZVIERATÁ



A BOOST FOR SOIL, PLANTS AND ANIMALS