

MG-LSA 
10l (13,2 kg)

EU: PFC 1 (C)(I)(b)(i): Jednosložkové kapalné anorganické hnojivo s makroživinami

N (Mg) - 6,3 (9)

6,3 % celkový dusík (N) 84 g/l

6,3 % dusičnanový dusík

9 % oxid hořečnatý (MgO) 120 g/l, rozpustný ve vodě

Složky:

Magnesium nitrate¹ (CAS-Nr. 10377-60-3)

¹KSM 1: Látky a směsi z původního materiálu

Kapalina v roztoku.

Hodnota pH (1 % roztok): 4,7

Výrobce/Zabalil/a: Hechenbichler GmbH

Cusanusweg 7-9, A-6020 Innsbruck, Rakousko

Tel.: +43 512 29 18 10 - 0 | www.hechenbichler.com

Dovozce: Amalgerol CZ s.r.o.

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

Tel.: +420 724 726 597 | www.amalgerol.cz

Bezpečnostní pokyny: Zabránit kontaktu s kůží a očima, nedýchávat a nepolykat. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. Po použití umýt ruce. V případě nehody ihned konzultovat s lékařem. Při zasažení očí, okamžitě vypláchnout. Při vdechnutí nebo polknutí vypláchnout ústa a hodně se napít, nevyvolávat zvracení.

Skladování: Skladovat v originálním balení v dobře větraných prostorách při teplotě +5 °C až +25 °C. Chránit před mrazem, horkem a slunečním zářením. Obal musí být vždy těsně uzavřen. Skladovat odděleně od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Likvidace: Podle možností úplně využít. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

MG-LSA



POKYNY

Hnojivo pro použití v zemědělství a zahradnictví. Pouze pro profesionální použití. Pro zásobení rostliny hořčíkem přes list. Použít jen při skutečné potřebě. Doporučená aplikační množství jsou průměrné hodnoty z praxe. Pro exaktní použití doporučujeme půdní popř. listovou analýzu. Stanovené aplikační dávky nesmí být překročeny. MG-LSA aplikovat brzy ráno nebo večer. Neaplikovat při extrémním počasí (např. při vysokých teplotách nebo mrazu). Stříkat jen při nepoškozené voskové vrstvě listu. Nepoužívat na kultury pod sklem/folii.

Pomalou zamíchat do cisterny naplněné do poloviny vodou, úplně rozpustit, doplnit cisternu a stříkat. Během celé doby postřiku míchat. Před aplikací MG-LSA bezpodmínečně provést zkoušku mísitelnosti a snášenlivosti s ochrannými prostředky a preparáty jiných výrobců. Dbát při míchání pokynů všech výrobců. Nosit ochranný oděv. Nevdechovat postřikovou mlhu! Aplikátory řádně vyčistit před i po aplikaci.

DOPORUČENÉ APLIKACE

Aplikační množství na hektar: Minimální množství vody při aplikaci je 200 l/h.

OBILOVINY: 1 - 2 l od 3-listového stádia (BBCH 13), při potřebě opakovat v rozmezí 10 - 14 dní. U pšenice pro dodatečné zlepšení kvality opakovat od tvorby listového praporce až do doby před kvetením (BBCH 39 - 59).

BRAMBORY: 1 - 2 l jakmile bude dostatečné olistění pro příjem, při potřebě opakovat v rozmezí 10 - 14 dní.

ZELENINA, CUKROVKA, ZELÍ: 1 - 2 l od 6 růstového stádia (BBCH 16) nebo na základě výsledků u listové analýzy, při potřebě opakovat v rozmezí 10 - 14 dní.

JÁDROVINY A PECKOVINY: 1 - 2 l od opadávání okvětních lístků (BBCH 69), při potřebě až 3-krát opakovat v rozmezí 21 dní.

www.amalgerol.cz

MG-LSA | CZ | 160x150 mm
Label version: 18.04.2025 12:17

AMALGEROL CZ
POSILUJE PŮDU, ROSTLINY, ZVÍŘATA

