



HNOJIVO EU: KFV 1 (C) (I) (b) (ii): Včesložkové kapalně anorganické hnojivo s makroživinami NP 10-34

10 % Celkový dusík (N) 138 g/l
10 % Amonný dusík (NH₃)
34 % Celkový oxid fosforečný (P₂O₅) 469 g/l
34 % Vodorozpustný oxid fosforečný (P₂O₅)
34 % P₂O₅ rozpustný v neutrálním citronanu amonném

Složky: Ammonium Polyphosphate¹ (CAS 68333-79-9),
Ammonium dihydrogenorthophosphate¹ (CAS 7722-76-1),
Diammonium hydrogenorthophosphate¹ (CAS 7783-28-0)
¹KSM 1: Látka a směs z povodního materiálu

Kapalina v roztoku.

Hodnota pH: 6 - 7



Výrobce / zabalil/a

Hechenbichler GmbH, Cusanusweg 7-9, A-6020 Innsbruck,
Rakousko, Tel.: +43 512 29 18 10 - 0 | www.hechenbichler.com

Dovozce

Amalgerol CZ s.r.o., Staroměstská 1504/1, 370 04 České
Budějovice, Tel.: +420 724 726 597 | www.amalgerol.cz

Pokyny

Obecně: POWERPHOS obsahuje stopy hořčiky. V závislosti na době skladování a teplotě může hořčik usazovat na dně nádoby. Obsah fosforu a dusíku však zůstává 100 %.

Skladování: V originálním balení skladovat v době větrných prostorách mezi +5 °C až +25 °C. Chránit před mrazem, horkem a slunečním zářením. Balení musí být vždy těsně uzavřené. Skladovat odděleně od potravin a krmiv. Uchovávat mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti: Při správném skladování 18 měsíců od data výroby (viz balení).

Likvidace: Podle možnosti zcela využít. Nevyužité zbytky zlikvidovat podle místní a národní platných ustanovení. Obaly řádně vyprázdněné od zbytků a odevzdat do sběru.

POZOR

Pokyny k jízdě:

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny:

P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P264 - Po manipulaci důkladně omýjte ruce.

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Obsah/obal likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Nebezpečné složky: Ammonium Polyphosphate (CAS 68333-79-9)

UFI: 3Y00-ROCD-D00M-371Y

Obsah/Obsahu: 10 l (13,8 kg)

Oblast použití

Tekuté hnojivo pro zemědělství a zahradnictví. Používat pouze v případě skutečné potřeby. Pro exaktní dávkování doporučujeme předtím a listovou analýzu. Neprekračovat doporučené dávkování.

Před použitím POWERPHOS spolu s postřikem a preparáty jiných výrobců bezpodmínečně provést test na mísitelnost a snášlivost. Je třeba dbát návodů k použití všech míchaných složek (produktů). Nepoužívejte v extrémních povětrnostních podmínkách (např. při silném slunečním svitu, při teplotách nad 25 °C, při nebezpečí mrazu, po deštivých obdobích).

POZOR: Nepoužívejte ve skleníku! Nemějte s přípravky obsahujícími měď, zinek a hořčík.

Před použitím řádně pretepať. Míchejte kontejnery! Vmíchat přes filtr do cisterny naplněné do ½ vodou, potom doplnit a sřít. (Během celé doby transportu a požitku míchat! Zamezte vedchování mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Aplikaci techniku před a po použití řádně vyčistit. Poslední použití před sklizní: nejmeně 8 dní.

Dávkování

Množství vody při postřiku min. 300 l/ha.

ŘEPAKA: Na jaře 3 - 5 l/ha po ukončení zimního klidu (BBCH 30); při potřebě (střední - silný nedostatek) 1 - 2 opakování po 10 - 14 dnech

CUKROVKA, LUSKOVINY: 4 - 8 l/ha od 6 listového stádia; při středním nebo velkém nedostatku aplikaci po 10 - 14 dnech (1 - 2 x) opakovat; u cukrovky 1 - 2 x 5 l/ha v červenci a druhou aplikaci doplnit 3 l BORMAX

KUKURICE: 5 l/ha od 4 - 8 listového stádia; při potřebě (střední - silný nedostatek) po 14 dnech opakovat

SLUNEČNICE: 2,5 - 5 l/ha dle nedostatku; při uzavření řádků

OBLIVINY: 2,5 - 5 l/ha od odnožování (BBCH 23) až do 3 stádia

tvorby kolének (BBCH 33); při potřebě (střední - silný nedostatek) po 14 dnech opakovat; dále pak 2 - 3 l při počátku metání (BBCH 49)

BRAMBORY: 3 - 5 l/ha od nasazení hlíz; 3 - 4 opakování vždy po 10 - 14 dnech

TRAVNÍ POROSTY: 10 l/ha k prvním obrůstání; 5 - 10 l/ha ke každé dalšímu obrůstání; Za 2 týdny po aplikaci možno spasat

KEJDA: 1 - 3 l/m² hnoj; vývoz s aplikací kejdivých dávek vmíchat do cisterny



HNOJIVO EU: PFC 1 (C) (I) (b) (ii): Včesložkové kvapalně anorganické hnojivo s obsahom makroživin NP 10-34

10 % Celkový dusík (N) 138 g/l
10 % Amonný dusík (NH₃)
34 % Celkový oxid fosforečný (P₂O₅) 469 g/l
34 % P₂O₅ rozpustný vo vode
34 % P₂O₅ rozpustný v neutrálnom citrátne amónnom

Složky: Ammonium Polyphosphate¹ (CAS-Nr. 68333-79-9),
Ammonium dihydrogenorthophosphate¹ (CAS 7722-76-1),
Diammonium hydrogenorthophosphate¹ (CAS 7783-28-0)
¹CNC 1: Pôvodné látky a zmesi

Kapalina v roztoku.

Hodnota pH: 6 - 7



Výrobce / Zabaliť

Hechenbichler GmbH, Cusanusweg 7-9, 6020 Innsbruck,
Rakousko, Tel.: +43 512 29 18 10 - 0 | www.hechenbichler.com

Dovozca

AMALGEROL SK s.r.o., Fraňa Kráľa 35, 811 05 Bratislava,
Tel.: +420 724 726 597 | www.amalgerol.sk

Pokyny

Všeobecně: POWERPHOS obsahuje stopy hořčiky. V závislosti od doby skladování a teploty může hořčik usazovat na dně nádoby. Obsah fosforu a dusíka však zůstává 100 %.

Skladování: Udržovat obaly těsně uzavřené a uchovávat na chladnom, dobre vetranom mieste. Odporúčaná skladovacia teplota: Hodnota +5 °C až +25 °C. Chránit pred mrazom, teplom, slnečným žiarením. Uchovávať oddelene od potravín a krmív. Uchovávať mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Doba použitelnosti: Při správném skladování 18 měsíců od datumu výroby (pozri balenie).

Likvidácia: Zabráňte vzniku odpadov alebo pokiaľ je to možné, zaistite minimalizáciu odpadov. Nesmie sa odstraňovať spoločne s odpadmi z domácnosti. Zabráňte úniku do kanalizácie. Odstránenie v súlade s lokálnymi a národnými predpismi.

POZOR

Štandardné vety o nebezpečnosti:

H302 Škodlivý po požití.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:

P280 - Noste ochranné okuliare/ochranu tváre.

P270 - Pri používaní tohto výrobku nejezte, nepijte ani nefajčite.

P264 - Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.

Ak používate kontaktné sošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337 + P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/mezinárodnými.

Nebezpečné složky: Ammonium Polyphosphate (CAS 68333-79-9)

UFI: 3Y00-ROCD-D00M-371Y



Oblasti použitia

Tekuté hnojivo pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo. Používať iba v prípade skutočnej potreby. Na exaktné dávkovanie odporúčame pôdnu a listovú analýzu. Neprekračovať odporúčané dávkovanie.

Pred použitím POWERPHOS spolu s postrokom a preparátmi iných výrobcov bezpodmínečne vykonať test na miešateľnosť a znášalivosť. Je potrebné dbať na návody na použitie všetkých zložiek miešania. Nepoužívať v extrémnych poveternostných podmienkach (napr. pri silnom slnečnom svite, pri teplotách nad 25 °C, pri nebezpečnej mrazu, po daždivých obdobiach).

POZOR: Nepoužívať v skleníku! Nemiešajte s prípravkami obsahujúcimi meď, zinok a horčík.

Pred použitím riadne pretepať. Miesajte kontajnery! Vmiešať cez filter do cisterny naplnenej do ½ vodou, potom doplniť a sřiekat. Počas celej doby transportu a postreku miešať! Zabráňte vdychovaniu hmly/par/aerosolov. Použíajte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné okuliare/tvárový štít. Aplikáciu techniku pred a po použití riadne vyčistit. Posledné použitie pred zberom: najmenš 8 dní.

Dávkovanie

Množstvo vody pri postreku min. 300 l/ha.

ŘEPAKA: Na jar 3 - 5 l/ha po ukončení zimného pokoja (BBCH 30); pri potrebe (stredný - silný nedostatok) 1 - 2 opakovania po 10 - 14 dnoch

CUKROVKA REPA, STRUKOVINY: 4 - 8 l/ha od 6 listového štádia; pri strednom alebo veľkom nedostatku aplikáciu po 10 - 14 dnoch (1 - 2 x) opakovat; pri cukrovke 1 - 2 x 5 l/ha v júli a druhú aplikáciu doplniť 3 l BORMAX

KUKURICA: 5 l/ha od 4 - 8 listového štádia; pri potrebe (stredný - silný nedostatok) po 14 dnoch opakovat

SLNEČNICA: 2,5 - 5 l/ha podľa nedostatku; pri uzavretí riadkov

OBLIVNINY: 2,5 - 5 l/ha od odnožovania (BBCH 23) až do 3 štádia tvorby kolienok (BBCH 33); pri potrebe (stredný - silný nedostatok) po 14 dnoch opakovat; ďalej potom 2 - 3 l na začiatku metania (BBCH 49)

ZEMIAKY: 3 - 5 l/ha od nasadenia hlíz; 3 - 4 opakovania vždy po 10 - 14 dnoch

TRAVNÉ PORASTY: 10 l/ha na prvé obrastanie; 5 - 10 l/ha na každé ďalšie obrastanie; Za 2 týždne po aplikácii možno spasť

HNOJIVOICA: 1 - 3 l/m² hnoj; vývoz s aplikáciou hnojivých dávok vmiešať do cisterny

