



SULFO-N 

EU: KfV 1(C)(I)(b)(i): Jednosložkové kapalně anorganické hnojivo s makroživinami

N (S) 12 (65) / 12 (26)

12% Celkový dusík (N)

12 % čpavkový dusík (N) 160 g/l

65 % Trioxid síry (SO_3) (= 26 % S), rozpustný ve vodě

Složky

Ammonium thiosulfate¹ (č. CAS 7783-18-8)
¹KSM 1: Látky a směsi z původního materiálu

Kapalina v roztoku. Nízký obsah chloridů.

Hodnota pH: 8 - 9

Výrobce / zabalil/a

Hechenbichler GmbH
 Cusanusweg 7-9, A-6020 Innsbruck, Rakousko
 Tel.: +43 512 29 18 100 | www.hechenbichler.com

Dovozce

Amalgerol CZ s.r.o.
 Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
 Tel.: +420 724 726 597 | www.amalgerol.cz

Bezpečnost

Vyvarovat se kontaktu s kůží a očima, nedýchávat a nepolykat. Během práce nejíst, nepít a nekouřit. Po použití umýt ruce. Nosit ochranný oděv a ochranné brýle. V případě nehody ihned konzultovat pomoc s lékařem. Při zasažení očí, okamžitě vypláchnout vodou. Při vdechnutí nebo polknutí vypláchnout ústa a hodně se napít, nevyvolávat zvracení.

Pokyny

Skladování: V originálním balení skladovat v dobře větraných prostorách mezi +5 °C až +25 °C. Chránit před mrazem, horkem a slunečním zářením. Balení musí být vždy těsně uzavřené. Skladovat odděleně od potravin a krmiv. Uchovávat mimo dosah dětí.

Likvidace: Podle možností zcela využít. Nevyužité zbytky likvidovat podle místně a národně platných ustanovení. Obaly řádně vyprázdněné od zbytků a odezdat do sběru.

Obsah/Obsahu: 10 l (13,3 kg)

www.amalgerol.cz
 www.amalgerol.sk

SULFO-N | CZ + SK | 230x148 mm | Label version: 28.11.2024, 09:04

Oblast použití

Tekuté hnojivo pro zemědělství a zahradnictví.

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Pro exaktní dávkování doporučujeme půdní nebo listovou analýzu. Nepřekračovat doporučené dávkování.

Před použitím SULFO-N spolu s postřikem a preparáty jiných výrobců bezpodmínečně provést test na mísitelnost a snášenlivost. Je třeba dbát návodů k použití všech míchaných složek (produktů). Nepoužívejte v extrémních povětrnostních podmínkách (např. při silném slunečním svitu, při teplotách nad 25 °C, při nebezpečí mrazu, po deštivých obdobích). **POZOR:** Nepoužívat na kultury pod sklem/folii. Stríkat jen při neporušené voskové vrstvě.

Před použitím řádně protřepat a promíchat. Vmíchat přes filtr do cisterny naplněné do ¾ vodou, potom doplnit a stríkat. Během celé doby transportu a postřiku míchat! Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Aplikáční techniku před a po použití řádně vyčistit.

DÁVKOVÁNÍ

Obiloviny: 5 l od odnožování (BBCH 23) až do 2-stádia tvorby kolének (BBCH 31), při potřebě (středního - silného nedostatku), po 10 - 14 dnech opakovat, množství vody: min. 200 l

Potravinářská pšenice: pro zvýšení obsahu proteinu: 5 l/ha mezi stád. 59 a 79, množství vody: min. 200 l

Kukuřice: 5 l od 4 - 8 stádia olistění, při potřebě (středního - silného nedostatku) po 10 - 14 dnech opakovat, množství vody: min. 200 l

Cukrovka, luštěniny, zelí, kapusta: 5 l od 6-listového stádia, při středním - větším nedostatku po cca 10 - 14 dnech (1 - 2x) opakovat. U cukrovky dodatečně 1 - 2 x 5 l při postřiku proti cerkospóriose, množství vody: min. 200 l

Řepka: 5 l na podzim od 4 - 6 listového stádia, na jaře 5 l od fáze prodlužování, při potřebě (středního - silného nedostatku) 1 - 2 opakovat v odstupu 10 - 14 dnů, množství vody: min. 200 l. Nestříkat v době kvetení!

Karotka, cibule, pórek, chřest: 5 l při cca 15 cm výšky růstu, při středním - silném nedostatku 1 - 2 opakování v odstupu 10 - 14 dnů, množství vody: min. 200 l

Brambory: 5 l cca 1 až 4 týdny po vzejití, při středním - silném nedostatku 1 - 2 opakování v odstupu 10 - 14 dnů, množství vody: min. 200 l



SULFO-N 

EU: PFC 1(C)(I)(b)(i): Jednosložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahem makroživiny

N (S) 12 (65) / 12 (26)

12 % Celkový dusík (N)

12 % čpavkový dusík (N) 160 g/l

65 % Trioxid síry (SO_3) (= 26 % S), rozpustný vo vode

Složky

Ammonium thiosulfate¹ (č. CAS 7783-18-8)
¹CMC 1: Původní látky a zmesi

Kvapalina v roztoku. Nízký obsah chloridů.

Hodnota pH: 8 - 9

Výrobca / Zabalil

Hechenbichler GmbH
 Cusanusweg 7-9, 6020 Innsbruck, Rakousko
 Tel.: +43 512 29 18 100 | www.hechenbichler.com

Dovozca

AMALGEROL SK s.r.o.
 Fraňa Kráľa 35, 811 05 Bratislava
 Tel.: +420 724 726 597 | www.amalgerol.sk

Bezpečnost

Zabráňte kontaktu s očima a pokožkou, nevychováť a neprehľtať. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare tvárou. V prípade nehody ihneď konzultovať pomoc s lekárom. **PO ZASTIHNUTÍ OČÍ:** Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. **PO POŽITÍ:** vypláchnite ústa a pít veľkou vodu. **NEVYVOLÁVAJTE** zvracanie.

Pokyny

Skladovania: udržiavať obaly tesne uzavreté a uchovávať na chladnom, dobre vetranom mieste. Odporúčaná skladovacia teplota: Hodnota +5 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom, teplom, slnečným žiarením. Uchovávať oddelene od potravín a krmív. Uchovávať mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Likvidácia: Zabráňte vzniku odpadov alebo pokiaľ je to možné, zaistite minimalizáciu odpadov. Nesmie sa odstraňovať spoločne s odpadmi z domácnosti. Zabráňte úniku do kanalizácie. Odstránenie v súlade s lokálnymi a národnými predpismi.



Oblasti použitia

Tekuté hnojivo pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo. Používať iba v prípade skutočnej potreby. Na exaktné dávkovanie odporúčame pôdnu alebo listovú analýzu. Neprekračovať odporúčané dávkovanie.

Pred použitím SULFO-N spolu s postrekom a preparátmi iných výrobcov bezpodmienčne vykonať test na miešateľnosť a zňašiteľnosť. Je potrebné dbať na návody na použitie všetkých zložiek miešania. Nepoužívať v extrémnych poveternostných podmienkach (napr. pri silnom snežnom svite, pri teplotách nad 25 °C, pri nebezpečenstve mrazu, po daždivých obdobiach). **POZOR:** Nepoužívať na kultúry pod sklom/fóliou. Striekať len pri neporušenej voskovej vrstve.

Pred použitím riadne pretrepať a premiešať. Vmiešať cez filter do cisterny naplnenej do ¾ vodou, potom doplniť a striekať. Počas celej doby transportu a postreku miešať! Zabráňte vdychovaniu hmly/par/aerosolov. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. Aplikácnú techniku pred a po použití riadne vyčistite.

Dávkovanie

Obilniny: 5 l od odnožovania (BBCH 23) až do 2-stádia tvorby kolienok (BBCH 31), pri potrebe (stredného - silného nedostatku), po 10 - 14 dňoch opakovat, množstvo vody: min. 200 l

Potravinárska pšenica: na zvýšenie obsahu proteínu: 5 l/ha medzi stád. 59 a 79, množstvo vody: min. 200 l

Kukurica: 5 l od 4 - 8 štádia olistenia, pri potrebe (stredného - silného nedostatku) po 10 - 14 dňoch opakovat, množstvo vody: min. 200 l

Cukrová repa, strukoviny, kapusta, kel: 5 l od 6-listového štádia, pri strednom - väčšom nedostatku po cca 10 - 14 dňoch (1 - 2x) opakovat. Pri cukrovke dodatočne 1 - 2 x 5 l pri postreku proti cerkospóriose, množstvo vody: min. 200 l

Řepka: 5 l na jeseň od 4 - 6 listového štádia, na jar 5 l od fázy predžltoženia, pri potrebe (stredného - silného nedostatku) 1 - 2 opakovat v odstupu 10 - 14 dní, množstvo vody: min. 200 l. Nestrieť v čase kvitnutia!

Mrkva, cibula, pór, špargľa: 5 l pri cca 15 cm výšky rastu, pri strednom - silnom nedostatku 1 - 2 opakovania v odstupu 10 - 14 dní, množstvo vody: min. 200 l

Zemiaky: 5 l cca 1 až 4 týždne po vzejdení, pri strednom - silnom nedostatku 1 - 2 opakovania v odstupu 10 - 14 dní, množstvo vody: min. 200 l

AMALGEROL CZ
 POSILUJE PŮDU, ROSTLINY, ZVÍŘATA



AMALGEROL SK
 POSILUJE PŮDU, RASTLINY, ZVIERATA



HECHENBICHLER
 A BOOST FOR SOIL, PLANTS AND ANIMALS

