



HNOJIVO EU: KfV 1 C(I)(b)(i): Jednosložkové kapalně anorganické hnojivo s makroživinami 55 v hmotnostních % síra (S) - elementární (S) (55)

Složení: síra* (CAS-Nr. 7704-34-9) *KM 1: Látky a směsi z původního materiálu Kapalně anorganické hnojivo v suspenzi.

Výrobce/zabálil/a: Hechenbichler GmbH Cusanusweg 7-9, A-6020 Innsbruck, Rakousko Tel.: +43 512 29 18 10 - 0 | www.amalgerol.com

Dovozce: Amalgerol CZ s.r.o., Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice Tel.: +420 724 726 597 | www.amalgerol.cz



Pokyny

Bezpečnostní pokyny: Zabránit kontaktu s kůží a očima, nevdechovat a nepolykat. Během práce nejíst, nepít a nekouřit. Po použití umýt ruce. Nosit ochranný oděv a ochranné brýle. V případě nehody ihned konzultovat s lékařem. Při zasažení očí, okamžitě vypláchnout. Při vdechnutí nebo polknutí vypláchnout ústa a hodně se napít, nevyvolávat zvracení.

Skladování: Skladovat v originálním balení v dobře větrávaných prostorách při teplotě +5 °C až +25 °C. Chránit před mrazem, horkem a slunečním zářením. Obal musí být vždy těsně uzavřen. Skladovat odděleně od potravin a krmiv. Uchovávat mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby (viz číslo šarže).

Likvidace: Podle možnosti úplně využít. Nevyužité zbytky likvidovat podle místních a národních ustanovení. Obaly řádně vyprázdněné od zbytků odvezdát do sběru.



Oblast použití

Hnojivo pro použití v zemědělství a zahradnictví. Doporučená aplikační množství jsou průměrné hodnoty z praxe. Pro exaktní dávkování doporučujeme půdní a listovou analýzu.

Nepoužívat při silném slunečním záření popř. při teplotách nad 25 °C.

Nejedná se o nebezpečný náklad ve smyslu zákona; je nutné dodržovat běžná bezpečnostní opatření jako při zacházení s chemikáliemi. Aplikační techniku před a po použití řádně vyčistit. Před aplikací s chemickými ochrannými prostředky nebo s jinými hnojivy je nutné provést zkoušku místelnosti.

Před použitím dobře protřepat; vmíchat přes filtr do cisterny naplněné do 2/3 vodou. Cisternu doplnit a stříkat, během celého transportu/postřiku míchat!

Dávkování

Množství vody při postřiku min. 300 l/ha!

Obiloviny: 2 - 3 l/ha od odnožování (BBCH 23), až do tvorby kolénků (BBCH 33); při potřebě (střední - silný nedostatek) po 10 - 14 dnech opakovat; dále 2 - 3 l/ha na počátku metání (BBCH 49); množství vody: min. 300 l/ha

Kukuřice: 5 l/ha od 4 - 8 stádia olístění; při potřebě (střední - silný nedostatek) po 10 - 14 dnech opakovat; množství vody: min. 300 l/ha

Cukrovka, lukoviny, kapusta, zelí: 3 - 5 l/ha od 6-listového stádia; při středním nebo silném nedostatku aplikaci po cca. 10 - 14 dnech (1 - 2x) opakovat, u cukrovky 2. aplikaci doplnit 3 l/ha Bormaxu, u cukrovky dodatečně doplnit 1 - 2 x 5 l/ha v červenci, množství vody: min. 300 l/ha

Řepka: 2 - 3 l/ha na podzim od 6-listového stádia; na jaře 3 - 5 l/ha po ukončení zimního klidu (cca. BBCH 30); při potřebě (střední - silný nedostatek) 1 - 2 opakování v odstupu 10 - 14 dnů; množství vody: min. 300 l/ha

Karotka, cibule, pórek, chřest: 3 - 5 l/ha cca. 1 až 4 týdny po vzejití; při středním - silném nedostatku 1 - 2 opakovat v odstupu 10 - 14 dnů; množství vody: min. 300 l/ha

Brambory: 3 - 5 l/ha cca. 1 až 4 týdny po vzejití; při středním - silném nedostatku 1 - 2 opakovat v odstupu 10 - 14 dnů; množství vody: min. 300 l/ha

Vínice: 2 - 3 l/ha při rašení (zazelenání); 1 - 4 opakování až do ukončení tvorby hroznů; množství vody 500 - 1000 l/ha

Ovocnářství: 2 - 3 l/ha před květením; 1 - 3 opakování až do zbarvení plodů; množství vody 500 - 1000 l/ha

Pastviny, Louky: 10 l/ha při prvním obrůstání; 5 - 10 l/ha, ke každému dalšímu obrůstání, čekací doba pro spásání: 3 týdny; množství vody min. 300 l/ha nebo spojit s vyvážkou kejdy



HNOJIVO EÚ: PFC 1 C(I)(b)(i): Jednosložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživín

55 v hm. % elementárnej síry (S) (55)

Složenie: síra* (CAS-Nr. 7704-34-9)

*CMC 1: Pôvodné látky a zmesi

Kvapalné anorganické hnojivo v suspenzii.

Výrobca/Zabálil: Hechenbichler GmbH Cusanusweg 7-9, A-6020 Innsbruck, Rakúsko Tel.: +43 512 29 18 10 - 0 | www.amalgerol.com

Dovozca: AMALGEROL SK s.r.o., Fraňa Kráľa 35, 811 05 Bratislava Tel.: +420 724 726 597 | www.amalgerol.sk



Pokyny

Bezpečnostní pokyny: Zabránit kontaktu s pokožkou a očima, nejedzte, nepít a nefajčíte. Po použití si umyte ruce. Nosit ochranný oděv a ochranné okuliare. V případě nehody okamžitě vyhledat lékaře. V případě očního kontaktu, okamžitě opláchnout. Při vdechnutí nebo požití vypláchnout ústa a vypít veľa vody. Nevyvolávat zvracení.

Skladování: V původním obale, v dobře vetranom priestore pri teplote od +5 °C do +25 °C. Chránit pred mrazom, teplom a slnečným žiarením. Obal vždy udržiavajte pevne uzavretý. Skladovať oddelene od potravín a krmív. Mnoho dosahu detí.

Trvanlivost: 24 mesiacov od dátumu výroby (pozri číslo šarže).

Likvidácia: Ak je to možné, použite ho úplne. Nepoužívané zvyšky by sa mali likvidovať v súlade s miestnymi a vnútroštátnymi predpismi. Obaly riadne vyprázdené od zvyškov odovzdať do zberu.



Oblast použití

Hnojivo na použitie v poľnohospodárstve a záhradníctve. Odporúčané aplikačné dávky sú priemerné hodnoty z praxe. Na presné dávkovanie sa odporúča analýza pôdy a listov. Neaplikujte pri silnom slnečnom žiarení alebo pri teplotách nad 25 °C. Nejde o nebezpečný náklad v zmysle zákona; je nutné dodržiavať bežné bezpečnostné opatrenia ako pri manipulácii s chemikáliami.

Technika aplikácie

Pred použitím a po použití riadne vyčistite. Pred použitím s chemickými ochrannými prostriedkami alebo s inými hnojivami, musí sa vykonať test miešateľnosti. Pred použitím dobre prepreťte; premiešajte cez filter do nádrže naplnenej po 2/3 vodou. Nádrž naplňte a postriekajte, miešajte počas celej prepravy/striekania!

Dávkovanie

Množstvo vody na postrek min. 300 l/ha!

Obilniny: 2 - 3 l/ha od vzhádzania (BBCH 23) do vytvorenia kolienok (BBCH 33); V prípade potreby zopakujte po 10 - 14 dňoch (stredne ťažký - ťažký nedostatok); potom 2 - 3 l/ha na začiatku metania (BBCH 49); množstvo vody: min. 300 l/ha

Kukurica: 5 l/ha od štádia 4 - 8 listov; v prípade potreby (stredný - silný nedostatok) opakovat po 10-14 dňoch; množstvo vody: min. 300 l/ha

Cukrová repa, strukoviny, kapusta, kel: 3 - 5 l/ha od štádia 6 listov; pri strednom alebo silnom nedostatku aplikáciu približne po 10 - 14 dňoch. Opakujte (1 - 2 krát); pri cukrovej repe doplníte 2. aplikáciu 3 l/ha Bormaxu; pri cukrovej repe ďalšie 1 - 2 x 5 l/ha v júli, množstvo vody: min. 300 l/ha

Repka olejná: 2 - 3 l/ha na jeseň od štádia 6 listov; na jar 3 - 5 l/ha po ukončení zimného klidu (cca BBCH 30); v prípade potreby (stredný silný nedostatok) 1 - 2 opakovania s odstupom 10 - 14 dní; množstvo vody: min. 300 l/ha

Mrkva, cibuľa, pór, špargľa: 3 - 5 l/ha približne 1 až 4 týždne po vzejdení; ak stredne ťažký až ťažký nedostatok 1 - 2 opakovania v intervale 10 - 14 dní; množstvo vody: min. 300 l/ha

Zemliaky: 3 - 5 l/ha približne 1 až 4 týždne po vzejdení; v prípade stredného až silného nedostatku 1 - 2 opakovania s odstupom 10 - 14 dní; množstvo vody: min. 300 l/ha

Vínohrady: 2 - 3 l/ha pri raste (zazelenanie); 1 - 4 opakovania až do ukončenia tvorby bobulí množstvo vody 500 - 1000 l/ha

Pestovanie plodov: 2 - 3 l/ha pred kvitnutím; 1 - 3 opakovania do vyfarbenia ovocia; množstvo vody 500 - 1000 l/ha

Pastviny, lúky: 10 l/ha pri prvom nevien najš správne slovo pre obrúšťaní; 5 - 10 l/ha, ku každému každé nasledujúce kyprenie; čakacia doba na pastvu: 3 týždne; množstvo voda min. 300 l alebo kombinovať s hnojivou

Obsah/Obsahu: 10 l (14,4 kg)

www.amalgerol.com

SULFOMAX (12 + SK) 1200348 001 | Label created: 18.04.2024, 13:57

HECHENBICHLER

A BOOST FOR SOIL, PLANTS AND ANIMALS



CZ Bezpečnost	SK Bezpečnosť
Signální slova: VAROVÁNÍ	Výstražné slovo: POZOR
Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži.	Štandardné výstražné upozornenia: H315 Dráždí kožu.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranný očí/ochranný štít. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.	Pokyny na bezpečné zaobchádzanie: P280 Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné okuliare/ochrannu bránu. P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Index No.: 016-094-001 CAS-No.: 7704-34-9 UFI: 5W10-302R-300G-D90F	