

ZINKCHELAT

10 l (13 kg)

HNOJIVO EU: PFC1 (C) (II) (a): Jednosložkové anorganické hnojivo se stopovými živinami

Hnojivo se stopovou živinou v chélat

7,2 % zinek (Zn) 94 g/l, jako EDTA-Chelat, ve vodě rozpustné (Zn) (7,2)

Složení: Diammonium $[[N,N'\text{-ethylenebis}([N\text{-}(\text{carboxylatomethyl})\text{glycinato}]](4\text{-}N,N',O,O',ON,ON')\text{zincate}(2\text{-})^1]$ (CAS-Nr. 67859-51-2)
¹KSM1: Látka a směsí z původního materiálu

Hodnota pH: 6 - 7

Výrobce/Zabalil/a: Hechenbichler GmbH
Cusanusweg 7-9, 6020 Innsbruck, Rakousko
Tel.: +43 512 29 18 10 - 0 | www.amalgerol.com

Dovozce: Amalgerol CZ s.r.o.
Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Tel.: +420 724 726 597 | www.amalgerol.cz

Číslo šarže:

Bezpečnostní pokyny: Vyvarovat se kontaktu s kůží a očima, nedýchat a nepolykat. Během práce nejíst, nepít a nekouřit. Po použití umýt ruce. Nosit ochranný oděv a ochranné brýle. V případě nehody ihned konzultovat pomoc s lékařem a slunečním zářením. Balení musí být vždy vodou. Při vdechnutí nebo polknutí vypláchnout ústa a hodně se napít, nevyvolávat zvracení.

Skladování: V originálním balení skladovat v dobře větraných prostorách mezi +5 °C až +25 °C. Chránit před mrazem, horkem a slunečním zářením. Balení musí být vždy těsně uzavřené. Skladovat odděleně od potravin a krmiv. Uchovávat mimo dosah dětí.

Likvidace: Podle možností zcela využít. Nevyužité zbytky zlikvidovat podle místní a národní platných ustanovení. Obaly řádně vyprázdněné od zbytků a odevzdat do sběru.

ZINKCHELAT



POKYNY

Použít jen při skutečné potřebě. Doporučené aplikační dávky jsou průměrné hodnoty z praxe. Pro exaktní použití doporučujeme půdní, popř. listovou analýzu. Stanovené aplikační dávky nesmí být překročeny. Nepoužívat při extrémních povětrnostních podmínkách (např. při vysoké teplotě nebo při nebezpečí mrazů). Stríkat jen při neporušené voskové vrstvě listu. Nepoužívat pro kultury pod sklem a fólií.

DOPORUČENÉ APLIKACE

Hnojivo pro použití v zemědělství a zahradnictví.

Obsah před použitím řádně protřepat! Pomalu vmíchat do cisterny naplněné do poloviny vodou, úplně rozpustit, doplnit cisternu vodou a stříkat. Během celé doby postřiku míchat! Před aplikací našeho produktu s ochrannými prostředky a preparáty od jiných výrobců je třeba bezpodmínečně provést zkoušku mísitelnosti a snášenlivosti. Při míchání je třeba dbát pokynů všech výrobců. Postřikovač řádně vyčistit před i po aplikaci.

Aplikační množství na ha: Množství vody při postřiku min. 200 l/ha.

Obiloviny: 1 l při sloupkování (BBCH růstová fáze 20 - 30), 1 - 3 l při vymetání klasů (BBCH 40), při středním až vysokém nedostatku opakovat v rozmezí 10 - 14 dní.

Brambory: 1 l od vyrašení (BBCH 10), při středním až vysokém nedostatku opakovat v rozmezí 10 - 14 dní.

Mák: 1 l před fází květního poupěte (BBCH 50)

Kukuřice: 1 l od 4 - 8 listového stádia (BBCH 14 - 18)

Cukrovka, luskoviny, zelí: 1 l od 6 listového stádia (BBCH 16), při středním až vysokém nedostatku opakovat v rozmezí 10 - 14 dní.

Chmel: 1 l ve 3 - 5 aplikacích až do květu.

Víno, peckoviny a jádroviny: 1 l mezi rašením a kvetením, při potřebě opakovat.



www.amalgerol.cz

ZINKCHELAT | CZ | 160x125mm
Label version: 05.01.2023, 13:32

AMALGEROL CZ

POSILUJE PŮDU, ROSTLINY, ZVÍŘATA

